

Preparazione del paziente al Test Respiratorio “Breath Test” per Helicobacter Pylori

Per realizzare un test corretto il paziente deve essere a digiuno e non aver fumato nelle 6 ore precedenti.

Inoltre devono essere trascorse almeno **4 settimane dalla fine della terapia antibatterica e 2 settimane dall’ultima dose di farmaci antisecretori gastrici.**

Per eseguire il prelievo di espirato basale e dopo ingestione di C-Urea+Ac.Citrico in 200 ml di acqua, il paziente deve fermarsi in Laboratorio **circa un’ora.**

LISTA FARMACI GASTROPROTETTORI piu’ diffusi

ANTRA (Omeprazolo)	PANTORC (Pantoprazolo)
AXAGON (Esomeprazolo)	PARIET (Rabeprazolo)
BIOMAG (Cimetidina)	PEPTAZOL (Pantoprazolo)
BRUMETIDINA (Cimetidina)	RANIBEN (Ranitidina)
CITIMID (Cimetidina)	RANIBLOC (Ranitidina)
CRONIZAT (Nizatidina)	RANIDIL (Ranitidina)
DINA (Cimetidina)	RANIDIZ (Ranitidina)
EURECEPTOR (Cimetidina)	STOMET (Cimetidina)
FAMODIL (Famotidina)	TAGAMET (Cimetidina)
GASTRIDIN (Famotidina)	TEMIC (Cimetidina)
LANSOX (Lansoprazolo)	ULCEDIN (Cimetidina)
LEBLON (Pirenzepina)	ULCESTOP (Cloridrato di Cimetidina)
LIMPIDEX (Lansoprazolo)	ULCEX (Ranitidina)
LOSEC (Omeprazolo)	ULCODINA (Cimetidina)
MEPRAL (Omeprazolo)	ULCOMEDINA (Cimetidina)
NIZAX (Nizatidina)	ULIS (Cimetidina)
NOTUL (Cloridrato di Cimetidina)	ZANIZAL (Nizatidina)
OMEPRAZEN (Omeprazolo)	ZANTAC (Ranitidina)
PANTECTA (Pantoprazolo)	ZOTON (Lansoprazolo)
PANTOPAN (Pantoprazolo)	

Preparato Dott.ssa L.Barbanera

Approvato Direttore Sanitario

Data 10-09-2018

Data 10-09-2018